

人的一張臉由不同的線交錯形成，這些線在相互平衡和諧的情況下，形成一張好看的臉。但隨著年齡的增長，這些線會變形或消失，舉例說，男士因脫髮而不斷後移的前額髮線，還有女士們因臉部鬆弛而漸模糊的下頷線（Jowl Line）。究竟有甚麼方法可以重拾失去的下頷線呢？

# 逐漸失去的下頷線

### 肉毒桿菌（Botulinum Toxin）

下頷線提升，又稱 Nafertiti Lift（娜芙蒂蒂拉提），沿著下頷線在皮下注射肉毒桿菌素，能鬆解因強而有力的頸闊肌（platysma）所造成的強大向下拉扯力，令下頷線可以更加明顯。此項治療適合臉部皮膚尚緊緻，但因頸闊肌太強令下頷線不明顯女士。

### 皮膚填充劑（Dermal Filler）

常用的為透明質酸，能夠有效地填滿因年齡而出現的臉部輪廓下垂情況，藉著填充顴骨位置、法令紋等位置，令整體輪廓得到改善，而令下頷線能夠回復支撐承拓力。

### 單極射頻緊膚（Monopolar Radiofrequency）

技術利用熱透原理，由表面熱透至皮下 2.5mm 深度，藉著高溫收緊皮下纖維組織，重造膠原蛋白，令開始鬆垮的皮膚可以再次緊緻起來，同時因為膠原蛋白的再造，令皮膚表面的幼紋也能被改善。此治療適合在皮膚初期出現鬆弛時使用。

### 聚焦超聲波（High Intensity Focused Ultrasound）

俗稱 HIFU 或超聲刀，可以直達皮下 4.5mm 的肌膜層（SMAS），利用熱固原理產生熱固點而令肌膜層收縮而產生拉緊作用，效果有如進行了微型拉皮一般，有效地達到拉緊效果。

### 埋線拉提（Thread Lifting）

若對以上各項的效果已經到達極限的時候，若果想進一步改善，就必須借助理線拉提（Thread Lifting）的方法。利用由聚左乳酸為材料可自行在體內分解的線，而線的兩端含有幾組微小錐體，就如小鈴鐺一樣，能牢牢地把線固定在皮下約 3.5mm 的深度，比較其他線，如金線、玫瑰線等更穩固而且不易走位，每邊兩至三組線已經能帶出效果，相比起 PDO 蛋白線每邊臉動輒需要 50 條線或以上，過程的確來得較輕鬆而且效果亦較為持久。

現今醫學美容的技術不斷革新及改善，對愛美或對儀容有要求的女士們，不再為逐漸失去的下頷線而感到困惑了！

